

Faculté de Médecine
de Sousse


Faculté de Médecine
de Monastir

Organisent les

26^{es}

Journées

DE MEDECINE DU TRAVAIL DU CENTRE



SOUSSE - HOTEL TEJ MARHABA
9 et 10 mai 2014

PROGRAMME
RESUMES

Salle 3 de l'hôtel

Samedi 10 Mai 2014
8 H 30 - 10 H 30

Session Orale :

Communications Orales Thématiques

Co-Présidents : Pr. Imed GARGOURI
Pr. Charfeddine AMRI
Dr Lotfi CHEMLI
Dr Hmida BOUSLAH

- 01** Etude de la prévalence du tabagisme chez les professionnels de santé dans la région de Sousse.
N. ZAMMIT
- 02** Burn-out des travailleurs du secteur tertiaire d'une ville de l'Ouest algérien.
C.KANDOUCI
- 03** La part de l'épuisement professionnel dans la genèse des accidents du travail.
M. HAJJI DAROUICHE
- 04** Epuisement professionnel chez les soignants en pratique oncologique.
H. BEN MESSAOUD
- 05** Santé, vieillissement et contraintes posturales : prévenir et accueillir le vieillissement.
H. AROUI
- 06** Programme de prévention des risques CMR dans la région de Sousse (selon la méthode INRS).
E. ESSANAA
- 07** Absences au travail liées aux tendinites des épaules.
A. MAHFOUDH
- 08** La surdité professionnelle déclarée durant les dix dernières années dans la région du centre tunisien.
H. KAMMOUN
- 09** Rôle des facteurs environnementaux et professionnels dans la survenue de la maladie de Parkinson. Enquête cas-témoins à Tlemcen (Algérie).
B. BEGHADLI
- 10** Les facteurs psycho-organisationnels source de pénibilité chez les chauffeurs de véhicules de poids lourds d'une société de transport international.
S. KAMMOUN

C 2

BURN-OUT DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR TERTIAIRE D'UNE VILLE DE L'OUEST ALGERIEN

C. KANDOUCI¹, Z. Belhadj¹, A.B. Kandouci¹

¹Laboratoire de recherche en environnement et santé
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbès(Algérie)

Objectifs: Evaluer l'importance de la souffrance psychique des employés du secteur tertiaire d'une ville de l'Ouest Algérien ainsi que de déterminer les facteurs et les modérateurs qui interviennent dans la modification du risque de cette souffrance

Population et méthode: Des questionnaires standardisés ont été soumis à 753 employés du secteur tertiaire. Ces questionnaires comprennent 3 rubriques : 1. Une fiche socio professionnelle (21items), 2.Maslach Burn out Inventory : MBI (22items), 3.Job Personal Interaction Scale : JPIS 35 questions portant sur la perception de l'environnement de travail par l'individu L'analyse des données est réalisée à l'aide du logiciel SPSS, En univariée (chi-deux de Pearson, corrélations) et en multivariée (régression logistique).

Résultats: Le taux de réponse est de 78,75%, l'âge moyen $38,42 \pm 8,26$, sexe ratio 1,1 (prédominance féminine). Du Burn out est retrouvé dans 23,6% des employés. Après régression logistique et parmi les principaux déterminants sociaux de la souffrance psychique seule la prise de médicaments pour calmer les douleurs ($p=0,0002$) est restée significative. Concernant les déterminants « professionnels », le contact fort avec le public, le mode partiel de travail et l'ancienneté de plus de vingt et un ans dans la fonction, étaient significatifs avec respectivement ($p= 0,002$, $0,004$ et $0,02$). Pour les modérateurs de stress l'analyse multivariée retenait deux sous échelles défavorables : la formation ($p<0,01$) et les conflits de valeurs et valeur perçue ($p=0,02$).

Conclusion: Les actions de prévention pour réduire ou éliminer les facteurs d'impact identifiés toucheront directement l'environnement et la source de travail

Mots clefs : Risques, Burn-out, Sidi Bel-Abbès