

rivista quadrimestrale — gennaio - dicembre

1/2/3 2013



LAVORO E MEDICINA

ACTES DES

**XXVII JOURNÉES INTERNATIONALES MÉDITERRANÉENNES
DE MÉDECINE DU TRAVAIL**

22 - 24 MAI 2013

TURIN

ECIG

UN EXEMPLE D'EVALUATION D'UN SYNDROME COLLECTIF SPECIFIQUE Kandouci C., Kandouci A.B., Mahi M.....	216
EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS UN CHANTIER DE REPARATION NAVAL Liani N., Akif N., Khoudour Z., Mokri R., Lamara Mahamed A.....	216
FACTEURS DE FATIGUE VISUELLE CHEZ LES SALARIEES D'UN CENTRE D'APPEL TELEPHONIQUE Liani N., Akif N., Amari Sm., Lamara Mahamed A.....	217
EVALUATION DU SYNDROME METABOLIQUE CHEZ LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE DE DETERGENT A CASABLANCA Tazi M., Laraqui O., Laraqui S., Manar N., Caubet A., Verger C., Laraqui C. H.....	218
PREVALENCE DES HABITUDES TOXIQUES CHEZ LES GENS DE MER A TANGER Ghailan T., Laraqui O., Laraqui S., Manar N., Caubet A., Verger C., Laraqui C.H.....	218
PREVALENCE DES HABITUDES TOXIQUES EN MILIEU DU TRAVAIL AU MAROC Laraqui O., Laraqui S., Manar N., Caubet A., Verger C., Laraqui C.H.....	219
QUALITE DE VIE ET BIEN ETRE CHEZ LES PROFESSIONNELS DE SANTE. A PROPOS D'UNE ETUDE MULTICENTRIQUE El Mahi M., Laraqui O., Laraqui S., Manar N., Caubet A., Verger C., Laraqui C.H.....	219
DEPISTAGE ET PREVALENCE DU SYNDROME D'APNEES-HYPOPNEES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL CHEZ LES TRAVAILLEURS D'UNE ENTREPRISE METALLURGIQUE AU MAROC Laraqui S., Laraqui O., Manar N., Caubet A., Verger C., Laraqui C.H.....	220

On a publié les articles parvenus entre le 3 mai 2013.

CONTRIBUTION A LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN MILIEU PROFESSIONNEL

Kandouci¹ C., Kandouci¹ A.B., Lahmer² A.

¹Laboratoire de recherche en environnement et santé; Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbès(Algérie)

² SEMEP, CHU de Sidi Bel-Abbès (Algérie)

Objectifs: évaluer l'importance de la souffrance psychique des employés du secteur tertiaire d'une ville de l'Ouest Algérien ainsi que de déterminer les facteurs et les modérateurs qui interviennent dans la modification du risque de cette souffrance afin de mettre en point une prévention de fond et efficace. **Population et méthode:** des questionnaires standardisés ont été soumis à 753 employés du secteur tertiaire. ces questionnaires comprennent 3 rubriques : 1. Une fiche socio professionnelle (21items), 2.Maslach Burn out Inventory : MBI (22items), 3.Job Personal Interaction Scale : JPIS 35 questions portant sur la perception de l'environnement de travail par l'individu réparties en 6 rubriques. Les données recueillies étaient anonymes et confidentielles. L'analyse des données est réalisée à l'aide du logiciel SPSS, En univariée (chi-deux de Pearson, corrélations) et en multivariée (régression logistique). **Résultats:** le taux de réponse est de 78,75%, l'âge moyen $38,42 \pm 8,26$, sexe ratio 1,1 (prédominance féminine). Du Burn out est retrouvé dans 23,6% des employés. Après régression logistique et parmi les principaux déterminants sociaux de la souffrance psychique seule la prise de médicaments pour calmer les douleurs ($p=0,0002$) est restée significative. Concernant les déterminants « professionnels », le contact fort avec le public, le mode partiel de travail et l'ancienneté de plus de vingt et un ans dans la fonction, étaient significatifs avec respectivement ($p= 0,002, 0,004$ et $0,02$). Pour les modérateurs de stress l'analyse multivariée retenait deux sous échelles défavorables : la formation ($p<0,01$) et les conflits de valeurs et valeur perçue ($p=0,02$). **Conclusion:** la prévalence de la souffrance psychique dans le secteur tertiaire est élevée. Les actions de prévention pour réduire ou éliminer les facteurs d'impact identifiés toucheront directement l'environnement et la source de travail : formation plus adaptée, amélioration de l'organisation de travail (en particulier le parasitisme des tâches) et la reconnaissance du travail effectué.

LES ALLERGIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE: A PROPOS DE 49 OBSERVATIONS

Benahmed A.1, Taleb A.1, Boudghene Stambouli O. 2

1service de médecine du travail, laboratoire de recherche Toximed, centre hospitalo-universitaire (CHUT) – Tlemcen;

2service de dermatologie, centre hospitalo-universitaire - Tlemcen.

Résumé

Les manifestations allergiques en milieu de travail, notamment les dermatites de contact allergiques (DCA), sont de plus en plus fréquentes. Par ailleurs, l'association entre allergie cutanée et respiratoire est peu rapportée dans la littérature. Nous étudions cette association à travers des observations colligées au service de Médecine du Travail du CHU Tlemcen.

Le but de ce travail était d'étudier les DCA et les affections respiratoires d'allure allergique ainsi que de proposer une démarche préventive. Il s'agissait d'une étude descriptive qui s'était déroulée de janvier à juillet 2010. Elle comprend une analyse des conditions de travail et une enquête médicale (questionnaires, examen clinique, EFR, tests allergologiques,...). La population étudiée est constituée de patients, pour lesquels le diagnostic de DCA professionnelle a été posé à l'issue de la consultation, soit un total de 49 patients inclus dans cette étude, avec une moyenne d'âge de 37.2 ± 10.4 ans. Les